



STATION POITOU-CHARENTES 03701 03013 00097 3076A 17/03/94-17h U

BIBLIOTHEQUE NATIONALE REGIE DEPOT LEGAL PERIODIQUES - SERVICE IMPRIMERIE 58. RUE RICHELIEU

75000 PARIS

Bulletin nº 258 (7/94) du 17 mars 1994

POIS

: Forte pression des sitones

BLE

: Remontée du risque rouille

COLZA

Stade E à F1

MELIGETHES

Situation

seuil de 2 méligèthes en moyenne inflorescence n'est pas atteint. Les colzas ne sont plus sensibles dès le début de la floraison.

Préconisation

Les traitements sont maintenant inutiles.

CHARANCONS DES SILIQUES

Situation

Vol ayant débuté le 9 mars puis aussitôt interrompu (températures insuffisantes). Le colza n'est pas encore au stade sensible (10 premières siliques ayant une longueur comprise entre 2 et 4 cm).

Préconisation

Il est beaucoup trop tôt pour intervenir.

MALADIES

Situation

Une grosse pression de pseudo est constatée, avec quelques taches sur étages foliaires intermédiaires.

Préconisation

La stratégie fongicide sera développée dans le prochain bulletin.

POIS

Stade levée à 2 feuilles.

SITONES

Situation

Attaque importante des sitones dès la levée.

Préconisation

Surveillez vos pois et intervenez dès que vous atteignez la note 2 (voir dossier Avertel page 20).

BLE Stade épi 1 à 4 cm.

PIETIN-VERSE

Situation

Nos notations ne montrent pas d'évolutions notables depuis le dernier bulletin.

Préconisation

* Note de risque supérieure ou égale à 12 : intervention contre le piétin toujours possible. Ne pas dépasser le stade 1 noeud.

* Note de risque inférieure à 12 : compte tenu du climat actuel, le risque piétin est plus faible, ce sont les maladies foliaires qui vont déterminer les périodes d'application.

ROUILLE BRUNE

Situation - Prévision

Rarement observée dans les Charentes, elle absente ailleurs. Les levées avant le 5 novembre seront particulièrement concernée sur la façade maritime.

Autres secteurs : le risque rouille reste conforme à nos prévisions du 7 février 1994.

Préconisation

traitement sur maladies Aucun foliaires nécessaire pour le moment.

ORGE

Stade épi 1cm à 4 cm.

MALADIES

Situation

Présence très marquée d'helminthosporiose. La rhynchosporiose s'exprime très fortement sur Orge de brasserie semée à l'automne.

Préconisation

intervenir au stade 1 noeud pour ces 2 maiadies. Une très forte attaque de rhynchosporiose peut justifier une intervention plus précoce bien que nous manquions de références précises.



Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX 13, Rte de la forêt - 86580 BIARD Abonnement annuel: 350 F. Tél.: 49.58.39.02

Publication périodique Directeur Gérant: G.GOARANT CPPAP no. 1664 A.D. ISSN 0294 - 4693

